

ID:

山口県立総合医療センター

様

FP+Cmab療法
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 28 日 6コース
休薬期間を含む(必須)

	投与量	手技	時間	Day1	2	3	4	5	..	8	..	15	..	22	..	28
セツキシマブ (初回)	400	mg/m ² 点滴静注	2hr	↓												
(2回目以降)	250	mg/m ² 点滴静注	1hr							↓		↓		↓		
5-FU	800	mg/m ² 持続静注	24hr	↓	↓	↓	↓									
ランダ CDDP	80	mg/m ² 点滴静注	2hr	↓												

Day 1-4

5-FU mg
生食 1000 ml 持続静注 24時間 4日間

Day 5

生食 50 mL フラッシュ用

Day 1

- デカドロン 6.6 mg
生食 100 ml 点滴静注 30分かけて
- アービタックス 初回 mg 400mg/m²
2回目以降 mg 250mg/m²
生食 初回 500 mL 点滴静注 初回投与 :2時間かけて
2回目以降 250 mL 2回目以降:1時間かけて

※アービタックス投与後1時間経過観察(初回)

- ヴァーンD 500x2 mL 点滴静注 4時間かけて
- プロイメンド 150 mg
生食 100 ml 点滴静注 30分かけて
- アロキシ 0.75 mg
生食 20 mL ワンシヨット静注
- ランダ mg
10%塩化ナトリウム 60 mL (3V)
生食 200 mL 点滴静注 2時間かけて
- 生食 500 ml
プリンペラン 10 mg 点滴静注 2時間かけて
- ヴァーンD 500 mL
フロセミド 0.5 A 点滴静注 3時間かけて

Day 2-3

- デカドロン 6.6 mg
生食 100 mL 点滴静注 30分かけて
- ヴァーンF 500 ml
フロセミド 0.5 A 点滴静注 4時間かけて
- ヴァーンF 500 ml 点滴静注 4時間かけて

Day 8,15,22

- デカドロン 6.6 mg
生食 100 ml 点滴静注 30分かけて
- アービタックス mg 250mg/m²
生食 250 mL 点滴静注 1時間かけて
- 生食 50 mL フラッシュ用

レスタミンコウ錠5錠:アービタックス投与30~60分前までに服用
※治療計画は変更になることがあります