

ID:

山口県立総合医療センター

様

A+AVd療法  
という治療です

科

医師名:

看護師:

薬剤師:

## 【治療計画】

1コース 28 日 6コース  
休薬期間を含む(必須) 最大6コース

		投与量	手技	時間	Day1	..	..	..	15	..	..28
アドリアシン	ADR	25 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	0.5hr	↓				↓		
ビンブラスチン	VLB	6.0 mg/m <sup>2</sup>	静注		↓				↓		
		(Max: 10mg/body)									
ダカルバジン	DTIC	250 mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2hr	↓				↓		
アドセトリス	ADC	1.2 mg/kg	点滴静注	0.5hr	↓				↓		
アロキシ			点滴静注		↓				↓		
イメンドカプセル			3日間内服		↓				↓		

※嘔気強ければイメンド(80) 1capを Day4, 5もしくはDay18, 19に追加

## 支持療法を含むセット

休薬完了

通しNo.	時間	Day1	Day15	28	
1) アロキシ デカドロン 生食	0.75 mg 6.6 mg 100 mL	点滴静注	30分 (200mL/h)	↓ ↓	↓ ↓
2) エクザール 生食	mg 20 mL	ワンショット静注		↓ ↓	↓ ↓
3) アドリアシン 生食	mg 100 mL	点滴静注	30分 (200mL/h)	↓ ↓	↓ ↓
4) ダカルバジン 生食	mg 250 mL	点滴静注	2時間 (125mL/h)	↓ ↓	↓ ↓
5) 生食	50 mL	フラッシュ用		↓ ↓	↓ ↓
6) アドセトリス 注射用蒸留水 生食	mg 2本 100 mL	点滴静注	30分	↓ ↓	↓ ↓
7) 生食	50 mL	フラッシュ用		↓ ↓	↓ ↓
8) ソリタT1号	500 mL	点滴静注	2時間	↓ ↓	↓ ↓
9) ソリタT1号	500 mL	点滴静注	2時間	↓ ↓	↓ ↓

## 処方

イメンドcap (125mg) 1cp 治療前服用  
イメンドcap (80mg) 1cp 1×朝 2日分嘔気強い場合、day4(day18)から2日間追加  
イメンドcap (80mg) 1cp 1×朝 2日分