

様

キイトルーダ+
ペムトレキセド+CBDCA療法

科

医師:
看護師:
薬剤師:

1コース 21日 4コース
休薬期間を含む(必須)

	投与量	手技	時間	Day-7	1	21
キイトルーダ	200 mg/body	点滴静注	0.5hr		↓					
ペムトレキセド(アリムタ)	500 mg/m ²	点滴静注	10分		↓					
カルボプラチン CBDCA	5 AUC	点滴静注	60分		↓					
葉酸(パンビタン末1g)*1	0.5 mg/day	p.o.		⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
VB12(メチコバル2A)*2	1 mg/day	i.m.		↓						

*1 葉酸:ペムトレキセド初回投与7日以上前から1日1回 0.5mg(パンビタン末1g)を連日経口投与
最終投与日から22日目まで可能な限り投与

*2 VB12:ペムトレキセド初回投与7日前に1回 1mg(メチコバル2A)を筋肉内投与
最終投与日から22日目まで3コースごとに投与

支持療法を含むセット

抗がん剤投与前 7日

- | | | | |
|--------------|---------------|----|-------------------------|
| 1) メチコバル | 2 A(3コースごと) | 筋注 | (最終投与日から22日目まで3コース毎に投与) |
| 2) 調剤用パンビタン末 | 1g 1×朝食後 21日分 | 内服 | (最終投与日から22日目まで可能な限り投与) |

休薬完了

通しNo.				day1	21
1)	アロキシ デカドロン 生食	0.75 mg 6.6 mg 50 mL	点滴静注	15分	↓
2)	キイトルーダ 生食	200 mg 100 mL	点滴静注	30分	↓
3)	アリムタ 生食	mg 100 mL	点滴静注	10分	↓
4)	カルボプラチン 生食	mg 350 mL	点滴静注	60分	↓
5)	生食	50 mL	点滴静注	フラッシュ用	↓
内服薬					
	イメンドcap(125mg)	1cap	1日1回	治療1時間~1時間半前	day1に内服
	イメンドcap(80mg)	1cap	1日1回	朝食後 2日間内服	day2から2日間内服

※治療計画は変更になることがあります