

ID:

山口県立総合医療センター

様

テセントリク+アブラキサン療法
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 28 日 コース
休薬期間を含む(必須) 可能な限り繰り返し投与

| | | 投与量 | 手技 | 時間 | Day1 | .. | 8 | .. | 15 | .. | .. | .. | 28 | 休薬完了 |
|--------|--------|-------------|------|-------|------|----|---|----|----|----|----|----|----|------|
| テセントリク | | 840 mg/body | 点滴静注 | 1.0hr | ↓ | | | | | | | | | |
| | | 840 mg/body | 点滴静注 | 30分 | | | | | ↓ | | | | | |
| アブラキサン | nabPTX | 100 mg/m2 | 点滴静注 | 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | |

※テセントリク投与時間 初回 1hr 2回目以降 30分

支持療法を含むセット

| 通しNo. | | | | Day1 | Day8 | Day15 | 28 | 休薬完了 |
|-------|--------------|------------------|-------------------------|------|------|-------|----|------|
| 1) | 生食 | 50 mL | プライミング | ↓ | | ↓ | | |
| 2) | テセントリク 生食 | 840 mg 250 mL | 点滴静注 初回:60分 2回目以降30分 | ↓ | | ↓ | | |
| 3) | 生食 | 50 mL | フラッシュ | ↓ | | ↓ | | |
| 4) | デカドロン 生食 | 6.6 mg 100 mL | 点滴静注 30分 | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 5) | 生食 | 50 mL | フラッシュ | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 6) | アブラキサン 生食 | mg mL | 点滴静注 30分かけて | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 7) | 生食 | 50 mL | フラッシュ | ↓ | ↓ | ↓ | | |