

ID:

山口県立総合医療センター

様

mFOLFOXIRI療法
という治療です

科

医師:
看護師:
薬剤師:

【治療計画】

1コース 14 日 コース
休薬期間を含む(必須) 可能な限り繰り返し投与

	投与量	手技	時間	Day1	214
トポテシン	CPT-11 150 mg/m ²	点滴静注	1hr	↓						
エルプラット	L-OHP 85 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						
レボホリナート	ℓ-LV 200 mg/m ²	点滴静注	2hr	↓						
5-FU	2,400 mg/m ²	持続静注	46hr	↓	↓	(≡ 持続注入)				

Day 1

- 1) アロキシ 0.75 mg
デカドロン 9.9 mg
生食 100 ml 点滴静注 30分かけて
- 2) トポテシン mg
生食 250 mL 点滴静注 1時間かけて
- 次の2種類の輸液を同時に投与
- 3) エルプラット mg
5%ブドウ糖注 250 mL 点滴静注 2時間かけて
- 3) レボホリナート mg
5%ブドウ糖注 250 mL 点滴静注 2時間かけて

Day 1~2 (46時間)

- 4) 5-FU mg
生食 100 mL (total量) 点滴静注 46時間かけて

内服薬

イメンドcap(125mg)	1cap	1日1回	治療1時間~1時間半前	治療日に内服
イメンドcap(80mg)	1cap	1日1回	朝食後 2日間内服	治療翌日から2日間内服
デカドロン錠(4mg)	2錠	1日2回	1回1錠 朝、昼食後 3日間内服	治療翌日から3日間内服
ワイパックス錠(0.5mg)	2錠	1日2回	1回1錠 朝、眠前 5日間内服	当日夜から内服

吐き気強い場合

day4から 2日分 イメンド(80)を追加

day5に デカドロン錠(4mg) 2錠 1日2回朝、昼食後 追加